

榧属(红豆杉科)一新种——四川榧

易同培¹ 杨 林¹ 隆廷伦²

(1. 四川农业大学都江堰分校 都江堰 611830)

(2. 四川省野生动物资源调查保护管理站 ,成都 610081)

摘 要 本新种在种子形态上与云南榧 *Torreya yunnanensis* Cheng et L. K. Fu 相似 ,不同在于体态为小乔木 ,高 4 ~ 5 m ,直径 10 ~ 15 cm ,叶较小 ,长 (1. 2)1. 5 ~ 2 cm ,宽 2. 2 ~ 3 mm ,先端具短尖头 ,基部圆形或圆楔形 ,上面仅下部有 2 条不明显的纵槽 ,下面 2 条灰白色气孔带较宽 ,其宽度与中脉和绿色边带近相等 ,带假种皮种子倒卵球形或稀近圆球形 ,较小 ,直径 1. 6 ~ 2 cm (云南榧 2 ~ 2. 5 cm) ,易于区别。

关键词 榧属 ;四川榧 ;新种 ;四川 ;中国

Torreya parvifolia a new species of the Taxaceae from Sichuan ,China

YI Tong-Pei¹ YANG Lin¹ LONG Ting-Lun

(1. Dujiangyan Campus ,Sichuan Agricultural University ,Dujiangyan 611830)

(2. Sichuan Province Wildlife Resource Survey and Conservation Station ,Chengdu 610081)

Abstract *Torreya parvifolia* Yi , L. Yang et Long , a new species of the Taxaceae from Sichuan , China , is described and illustrated. The new species is closely related to *Torreya yunnanensis* Cheng et L. K. Fu , from which it differs apparently by the shorter and smaller stem , 4 ~ 5 m high , 10 ~ 15 cm diameter ; smaller leaves , (1. 2)1. 5 ~ 2 cm long , 2. 2 ~ 3 mm broad , acute on the apex with short acumen , rotund or rotundly cuneate at the base , upper surface only below with inconspicuous 2-canalliculates , under surface with 2 stomatic bands broader grey white , nearly as width as midrib and green side ; seeds with arillate obovoid or rare nearly globose , smaller , 1. 5 ~ 2 cm diameter.

Key words *Torreya* Arn. ; *T. parvifolia* Yi , L. Yang et Long ; new species ; Sichuan ; China

2005 年 8 ~ 9 月 ,我们参加了四川布拖县等地的生物多样性野外考察 ,在做植物群落类型的调查过程中 ,于临近金沙江岸边的乌衣乡铅矿下方海拔 2 100 ~ 2 300 m 处发现了这个新种。本种分布面积不大 ,数量也不多 ,仅见于长约 2 km 的狭窄沟谷两侧陡坡或崖石上疏林中有少量散生。土壤母岩为流纹岩 ,山地黄壤 ,呈微酸性。植被类型属亚热带次生常绿与落叶阔叶混交林 ,群落中植物种类组成较丰富 ,除四川榧外 ,常见伴生树种有润楠、小叶女贞、化香、膀胱果、连香树、领春木、野漆等 ,下木优

势种多为竹类 ,草本多为禾草与蕨类。作者在野外初次见到这种裸子植物时 ,乍一看外形很似巴山榧 *Torreya fargesii* Franch. ,但也怀疑她的生长地与巴山榧产地不在同一个植物区系内 ,过往也从未在四川大小凉山地区发现有榧属植物的分布 ,嗣后又从种子解剖中看出很有可能就是云南榧 *T. yunnanensis* Cheng et L. K. Fu。本文第一作者于 9 月下旬至 11 月下旬在云南野外拍摄《中国竹类》照片时 ,在维西县永春乡赖石坎至锅底堂途中 ,发现了较多的云南榧生于针叶林中。据带路的村民讲 ,

当地的云南榧可长到 40 m 高,胸径达 4 m,是优良用材树种。榧属通常是雌雄异株植物,一片混生有云南榧的针阔叶混交林中往往不易发现结实植株。此次在较大面积有云南榧混交的林中仅发现一株结实的树,其采集到的标本(易同培 05058)为我们鉴定新种四川榧提供了很大的便利和准确性。本新种骨质种皮内壁有 2 条明显粗纵脊及小网状脊,胚乳猪脑状内皱,有 2 条对生深纵槽与云南榧相似,但体态为小乔木状,高达 5 m,直径 15 cm;叶较小,长(1.2)1.5~2 cm,宽 2.2~3 mm,仅上面下部有不明显的 2 条纵槽,基部圆形或圆楔形,下面 2 条灰白色气孔带较宽,其宽度与中脉和绿色边带近相等,带假种皮种子倒卵球形或稀近圆球形,较小,直径 1.5~2 cm,易于区别。国务院 1999 年 8 月 4 日批准的《国家重点保护植物名录(第一批)》中,榧属所有种均为二级保护植物。四川榧的发现,为裸子植物家族又增添了一种国家重点保护的新成员,应对其实行就地保护,并采用人工繁殖方法迁地保护。

四川榧 新种 图 1

Torreya parvifolia Yi, L. Yang et Long, sp. nov. Fig. 1

Differt haec species a *T. yunnanensi* Cheng et L. K. Fu arbusculis sempervirentibus, 4–5 m altis, 10–15 cm diametro; foliis minoribus, (1.2)1.5–2 cm longis, 2.2–3 mm latis, apice cuspidatis, basi orbiculatis vel orbiculato-cuneatis, supra inferne inconspicuo bicanaliculatis praeditis, subtus 2 canuo-stomatico-taeniis latioribus, latitudinibus earum costam et marginem viridem fere aequantibus; seminibus drupaceis obovatis vel raro nonnihil globosis, minoribus, 1.5~2 cm diametro.

Arbuscula sempervirens, 4–5 m alta, 10–15 cm diametro; cortex atrobrunneo, longitudinaliter rimosus necnon postlamellate deciduus. Rami oppositi

vel verticillati, ramulis patentibus, primo viridibus glabris, perulis glabris. Folia opposita vel nearly opposita, lineari-lanceolata, (1.2)1.5–2 cm longa, 2.2–3 mm lata, stricta vel leviter falcata, torta in biseries, rigida, apice cuspidata, basi orbiculata vel orbiculato-cuneata, supra laete viridia, leviter arcuata, inferne inconspicuo bicanaliculatis praedita, subtus canuo-stomatico-taeniis 2, latitudinibus earum costam et marginem viridem fere aequantibus, petioli c. 1 mm longi. Amenta nondum vidi. Semina drupacea tota in arillis carnosissimis, obovata vel raro nonnihil globosa, leviter farinosa, 1.5–2 cm diametro, apice mucronata; testis osseis fragilioribus laevibus, biporcis oppositis elevatissimis in pariete interne et porcis minute reticulatis, endospermiis recavis rugosissimis et bicanaliculatis profundis oppositis.

Sichuan(四川): Butuo(布拖), Wuyi(乌依), Wandunshan(万吨山), down lead mine region, geographical coordinates E102°56'49.6", N27°30'41.7", alt. 2 100–2 300 m, steep fields of the gorge, amidst sparse forest, 2005–08–29, T. P. Yi(易同培) 05025(holotype, SIFS = SAUD; isotype, SZ).

常绿小乔木,高 4~5 m,直径 10~15 cm,树皮暗褐色,片状纵裂并剥落。枝条对生或轮生,小枝开展,幼时绿色,无毛;芽鳞无毛。叶对生或近对生,线状披针形,长(1.2)1.5~2 cm,宽 2.2~3 mm,直或微成镰形,扭成 2 列,坚硬,先端具短尖头,基部圆形或圆楔形,上面亮绿色,微呈拱形,下部具 2 条通常不明显的纵槽,下面具 2 条灰白色气孔带,其宽度与中脉和绿色边带近相等,叶柄长约 1 mm。花枝未见。种子全部为肉质假种皮所包,核果状,倒卵球形或稀近圆球形,微被白粉,直径 1.5~2 cm,先端具短尖头,外种皮骨质,较脆性,光滑,内壁有 2 条对生明显隆起的纵脊及小网状脊,胚乳周围向内深皱,有 2 条对生的深纵凹槽。




图 1 四川榧

1. 种子枝 ; 2. 去假种皮的种子 ; 3. 外种皮一部分 , 示内面的纵脊 ; 4. 去假种皮和外种皮的种子 ; 5. 叶上面 ; 6. 叶下面

Fig. 1 *Torreya parvifolia* Yi , L. Yang et Long

1. A seedling branch ; 2. A seed without aril ; 3. A portion testa to show longitudinal ridge inner surface ; 4. A seed without aril and testa ; 5. Upper surface of a leaf ; 6. Lower surface of a leaf